

Prix Dollfus 1910. — Le Secrétaire déclare à la Société que le vote de M. F. PICARD, de Montpellier, s'est trouvé égaré au milieu des publications reçues à la séance du 8 mars et n'a pu être compté au moment du vote.

Voyages. — M. LÉON GARRETA, chargé d'une mission par M. le ministre de l'Instruction publique, annonce à la Société son départ pour les îles Canaries et Salvages. Notre collègue s'embarquera le 20 avril à bord du yacht « Adolphe-Marie » appartenant à M. Edmond BRETET, de Valognes, et sera de retour vers la fin d'août.

Rectifications. — M. GRANDJEAN, notaire à Urçay (Allier), a été présenté à la Société, non par M. Maurice PIC, mais par M. E. OLIVIER.

— Les commissaires-rapporteurs de l'élection de M. G. MELOU étaient MM. DUMONT et P. LESNE.

Observations diverses.

Synonymie. — M. L. BEDEL fait observer que l'*Aphodius lineato-setosus* Bend. [COL. SCARABAEIDAE], décrit dans le précédent *Bulletin* (p. 88), est synonyme de l'A. (*Melinopterus*) *gregarius* Har. (*Zuberi* Desbr. in litt.), espèce très connue et décrite depuis quarante ans.

La description du *lineato-setosus* ne s'applique qu'au sexe mâle.

Captures et observations. — M. P. DE PEYERIMHOFF signale la présence dans les Basses-Alpes de *Boreus hiemalis* L. [NEVR. PANORPIDAE] et du genre *Chionea* [DIPT. TIPULIDAE], récemment trouvés par M. LESNE en Alsace (cf. supra, p. 9). Le *Boreus* est commun en automne dans les mousses des forêts résineuses des environs de Digne. Le *Chionea* a été trouvé une seule fois, en plein hiver, dans la grotte de Cousson (*Ann. Soc. ent. France* [1906], p. 208). D'après le Prof. M. BEZZI, qui a publié en 1908 (*Societas entomologica*, XXIII, p. 97) une étude sur les espèces européennes de ce curieux genre, *C. araneoides*, L. serait, ainsi que *C. crassipes* Boh., strictement confiné dans le Nord de l'Europe (Laponie, Scandinavie et Finlande). C'est au *lutescens* Lundstr. qu'appartiendraient les *Chionea* de l'Europe moyenne, et tel est peut-être le cas de celui trouvé en Alsace. Une quatrième espèce, *C. alpina* Bez., a été décrite de la Valteline, et BEZZI pense qu'elle est répandue dans toutes les Alpes méridionales; c'est sans doute celle qui se rencontre aux environs de Digne.

Le genre *Chionea* avait été déjà mentionné par STROBL comme trouvé dans une caverne de Bosnie (Bezzi, l. c., p. 99, note 4). On doit donc le considérer comme faisant partie de la faune adventice des cavités

souterraines. Il est intéressant de rapprocher cette station accidentelle des habitudes normalement nivicoles de ces insectes.

D'autre part, M. P. DE PEYERIMHOFF signale la découverte, dans le Sud de la Tunisie, de *Seprania Bleusei* Pic, [COL. DERMESTIDAE] que représente la vignette de ce *Bulletin* (cf. supra, p. 9). Un individu de grande taille (4,25 mill.), trouvé à Nefta contre les vitres d'une fenêtre, lui a été donné par M. F. PELTIER.

La capture répétée de ce Dermestide sur les fenêtres des appartements est à remarquer; mais il semble peu probable qu'il faille y voir un insecte nocturne (*Bull. Soc. ent. France* [1899], p. 29). Son aire de dispersion est sans doute très étendue, comme celle de beaucoup d'espèces désertiques.

Communications.

Description d'une espèce nouvelle de *Rosalia* de Formose

[COL. CERAMBYCIDAE]

par P. BOPPE.

Rosalia Lesnei, n. sp. — *Nigra, prothorace supra et infra elytris-que rubris; antennarum apud ♂ et ♀ scapo pyriformi tenui et sat crebre punctato, articulis tertio, quarto et quinto apice valde penicillatis, tertio, quarto, quinto, sexto et septimo apice denticatis; prothoracis disco utrinque macula rotunda nigra et in medio maculis duabus. Elytris elongatis et in singulis maculis quinque nigris, prima ad scutellum, in quarta anteriore parte maculis duabus, prima versus suturam, secunda versus latus, in disci medio singula macula transverse elongata* ⁽¹⁾ *maculaque nigra in quarta posteriore parte.* — Long. 26 mill., élytres 18 mill., larg. 6 mill.

Stature svelte. Antennes longues, dépassant les élytres chez le ♂ de leurs quatre derniers articles, de leurs deux derniers seulement chez la ♀, à scape noir, finement et densément ponctué, garni en dessous, ainsi que le 2^e article, de longs cils soyeux, noirs; articles 3, 4, 5 recouverts d'une pubescence noire couchée de laquelle émerge, surtout en dessous, de longs cils soyeux et noirs qui se condensent dans les deux sexes en une touffe épaisse à l'extrémité apicale de l'article

(1) *Apud feminam nulla.*